3.

4.

5.

1.

2.

1

30min 37~40

3.

1 2

1 30min 37~40

4.

1

15 30min 37 40

5.

120ml 1

1.

30min 1 14 1

2.

5~15min 1 14 1

-

2012 [2]

1.

2.

1

2

3

24

3.

3~6 1

1. 2002

[3]

(24h)

(24h

) <95% >70%

(24h) <70% >30%

2. SLE-DAI

SLE-DAI

1.

1

	1	5	10	
	37.5 37.9	38 38.9	39	
			,	

	,		,	

2 = - / x100%

2. SLE-DAI

2 SLEDAI

8	
8	
8	
	↑ ↓
8	SLE
8	
8	
8	
8	
4	2
4	CPK ↑
4	HB RBC
4	>5RBC/HP
4	>0.5g/24h, ↑
4	>5WBC/HP
2	
2	
2	

2	
1	≥38
1	$<100x10^9/L$
1	$<3.0x10^9/L$

SLEDAI SLE 0~4 5~9 10~14 ≥15

[1] . [J]. ,2010,14(5):342-346.

[2] Bertsais GK Tektonidou M Amoura Z et a1 Joint European League Against Rheumatism and European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association(EULAR ERA-EDTA)recommendations for the management of adult and paediatfic lupus nephritisAnn[J] Rheum Dis 2012 71(11) 1771-1782.

[3] . [S]. 2002:112,115.